TRAITER LA KÉRATOSE ACTINIQUE (KA) AVEC ALDARA™

Aldara, imiquimod crème 5%, est indiqué dans le traitement topique des Kératoses actiniques cliniquement typiques, non hypertrophiques, non hyperkératosiques du visage ou du cuir chevelu, chez l'adulte immunocompétent lorsque la taille ou le nombre des lésions limite l'efficacité et/ou la tolérance de la cryothérapie et si les autres traitements topiques sont contre-indiqué ou moins appropriés.¹

POSOLOGIE ET MODALITÉS D'APPLICATION

1

application
par jour¹

3

fois par semaine
avant l'heure normale
du coucher¹

EXEMPLE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

● TRAITEMENT
● REPOS

Un cycle de traitement¹

• En quantité suffisante pour recouvrir toute la zone. La dose maximale recommandée est de un sachet¹

• Masser jusqu'à pénétration de la crème¹

• Laisser au contact de la peau pendant une huitaine d'heures puis il est indispensable de l'enlever avec de l'eau et un savon doux¹

Après un traitement médicamenteux ou chirurgical antérieur, attendre que la zone à traiter ait cicatrisé¹

* 4 semaines maximum, même en cas d'oubli ou de périodes de repos, le traitement ne doit pas être étendu au-delà de 4 semaines¹

En cas d'oubli d'une administration, le patient devra appliquer la crème dès que possible puis continuer le rythme habituel d'applications. Cependant, il convient de ne pas appliquer la crème plus d'une fois par jour.¹

Une interruption du traitement doit être envisagée si les réactions inflammatoires locales se développent ou si une infection est observée au site d'application.¹

1. RCP de la spécialité Aldara™ en vigueur.
2. Notice Aldara™

MODE D'EMPLOI **ALDARA™**

1. Appliquer²

Se laver les mains

Prendre un nouveau sachet, l'ouvrir délicatement

Appliquer une **couche fine** de produit sur la zone à traiter, **masser** pour faire pénétrer. Ne pas recouvrir de pansement, ni bandage, ni vêtement trop serré, etc...

Jeter le sachet ouvert (y compris s'il contient encore de la crème)

Se laver les mains à l'eau et au savon

2. Laisser agir²

Laisser le produit en contact pendant **6 à 10 heures** (≈ 8 h)

Ne pas prendre de bain ni de douche durant cette période

3. Laver soigneusement la zone traitée²

Il est indispensable d'enlever la crème avec de l'eau et un savon doux. Enfin, sécher délicatement.

MISE EN GARDE SPÉCIALE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter tout contact avec les yeux, les lèvres et les narines.
- La crème imiquimod est susceptible d'exacerber les affections cutanées inflammatoires.
- La crème imiquimod doit être utilisée avec précaution chez les patients ayant une maladie auto-immune.
- La crème imiquimod doit être utilisée avec précaution chez les patients ayant une transplantation d'organe.
- L'emploi de la crème imiquimod est déconseillé tant que la peau n'a pas cicatrisé après un traitement médicamenteux ou chirurgical antérieur.
- L'utilisation d'un pansement occlusif est déconseillée.
- Les excipients suivants méthylhydroxybenzoate (E 218) et propylhydroxybenzoate (E216) peuvent entraîner des réactions allergiques (éventuellement retardées). L'alcool cétylique et l'alcool stéarylique peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact). L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques et une légère irritation locale.
- L'imiquimod doit être utilisé avec précaution chez les patients ayant une réserve hématologique réduite.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique des médicaments en flashant ce QR code :
ou directement sur le site internet : <http://basedonnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

VIATRIS SANTE, RCS Lyon 399 295 385, 1 rue de Turin - 69007 Lyon, locataire gérant du fonds de commerce de Viatris Up.

VIATRIS SANTE, 1 bis place de la Défense - Tour Trinity - 92400 Courbevoie, établissement secondaire exploitant

FR-ALD-2024-00002 - Octobre 2024 - Visa n°24/10/66916232/PM/002