



Baricitinib — Information pour les patient(e)s
(Olumiant®)

Présentation

- **Nom du médicament** : Baricitinib (Olumiant®)
- **Forme** : comprimés de 2 mg ou 4 mg
- **Classe** : traitement qui diminue l'activité du système immunitaire (inhibiteur des Janus kinases 1 et 2)
- **Prix** : environ 593 € la boîte de 28 comprimés
- **Remboursement** : pris en charge à 65 % par la Sécurité sociale

Pourquoi est-il prescrit ?

En dermatologie, ce traitement est indiqué :

- Pour la **dermatite atopique modérée à sévère** (eczéma important nécessitant un traitement par comprimés).
- Pour la **pelade sévère** (perte de cheveux étendue), remboursée depuis fin 2023.

Comment le prendre ?

- Posologie habituelle : 4 mg une fois par jour.
- Le traitement dure souvent plusieurs mois.
- Peut être pris à tout moment de la journée, avec ou sans repas.
- La dose peut être réduite à 2 mg par jour selon l'évolution ou chez certains patients à risque (âge, maladies associées, insuffisance rénale...).

Points importants avant de commencer

Avant de débuter le traitement, votre médecin réalise :

- Un **bilan sanguin complet** (globules rouges, blancs, plaquettes, foie, reins, cholestérol, glycémie...).
- Un **dépistage des infections** (tuberculose, hépatites, VIH si besoin).
- Une **radiographie des poumons**.
- Un **point sur vos vaccins** : pas de vaccins vivants pendant le traitement (ROR, varicelle, fièvre jaune...).

Contre-indications

Le traitement ne doit pas être utilisé en cas de :

- Grossesse ou allaitement (contraception obligatoire pendant le traitement).
- Infections graves actives (ex. tuberculose).
- Cytopénies sévères (globules ou plaquettes très bas).
- Maladie grave du foie.
- Antécédents de réactions allergiques au médicament.

Surveillance pendant le traitement

- Consultations régulières avec votre dermatologue.
- Analyses de sang à 3 mois puis régulièrement (reins, foie, cholestérol, globules...).
- Contrôle de la tension artérielle.
- Surveillance de la peau.



Effets indésirables possibles

- Risque accru d'infections (respiratoires, urinaires, zona...).
- Risque de thrombose (caillot sanguin), surtout si vous avez des antécédents ou d'autres facteurs de risque.
- Troubles digestifs (douleurs abdominales, diverticulite, rares perforations).
- Rarement : anomalies sanguines, augmentation du cholestérol.

Prévenez rapidement votre médecin si vous présentez :

- fièvre, toux persistante, douleurs thoraciques ou abdominales, essoufflement, gonflement douloureux d'une jambe.

Grossesse et contraception

- Contre-indiqué pendant la grossesse.
- Éviter pendant l'allaitement.
- Une contraception efficace est indispensable pendant toute la durée du traitement.

À retenir

- ✓ Le baricitinib est un traitement efficace pour certaines formes sévères de dermatite atopique et de pelade.
- ✓ Une surveillance médicale étroite est indispensable.
- ✓ Respectez bien les rendez-vous avec votre médecin, et les bilans sanguins.
- ✓ Signalez à votre médecin tout antécédent d'infection, de caillot ou de maladie digestive.
- ✓ Ne recevez pas de vaccins vivants pendant le traitement.