



Brodalumab — Information pour les patient(e)s (Kyntheum®)

Présentation

- **Nom du médicament** : Brodalumab (Kyntheum®)
- **Forme** : injection sous la peau (seringue pré-remplie de 210 mg)
- **Classe** : traitement ciblé (biothérapie), anticorps qui bloque un récepteur impliqué dans l'inflammation (IL-17RA).
- **Prix** : environ 840 € les 2 seringues
- **Remboursement** : pris en charge à 65 % par la Sécurité sociale dans certaines formes sévères de psoriasis.

Pourquoi est-il prescrit ?

Le Kyntheum® est indiqué chez l'adulte (à partir de 18 ans) dans le traitement du :

- **Psoriasis en plaques chronique modéré à sévère**, lorsque :
 - au moins 2 autres traitements classiques (méthotrexate, ciclosporine, acitrétine, photothérapie) ont échoué, sont mal tolérés ou contre-indiqués,
 - et que la maladie est étendue et/ou a un fort retentissement sur la vie quotidienne.

Comment le prendre ?

- Le traitement se fait par injections sous la peau (ventre, cuisse, parfois bras).
- Début : 1 injection (210 mg) chaque semaine pendant 3 semaines.
- Puis : 1 injection toutes les 2 semaines en entretien.

Points importants avant de commencer

Avant le traitement, votre médecin vérifie :

- L'absence de contre-indication.
- Vos antécédents médicaux (infections, maladie de Crohn, tuberculose).
- Vos vaccins : pas de vaccin vivant pendant le traitement (ROR, varicelle, fièvre jaune...).

Contre-indications

Le traitement ne doit pas être utilisé en cas de :

- Allergie au produit.
- Infection grave en cours (tuberculose active, infection sévère).
- Maladie de Crohn active.
- Grossesse et allaitement (contraception obligatoire pendant et 12 semaines après le traitement).

Surveillance pendant le traitement

- Évaluation médicale de l'efficacité et de la tolérance entre 12 et 16 semaines, puis tous les 3 à 6 mois.
- Prise de sang : NFS + reins + foie avant le traitement puis environ tous les 3 mois (au cas par cas).
- Surveillance renforcée si apparition d'une infection ou autre problème de santé.

Effets indésirables possibles

- Infections (respiratoires, cutanées).
- Mycoses buccales (candidose oro-pharyngée).
- Aggravation possible d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MICI).
- Réactions au site d'injection, maux de tête, fatigue, nausées, éruptions cutanées.



Efficacité

- Le traitement doit être réévalué entre 12 et 16 semaines.
- Si aucune amélioration n'est observée, il est arrêté.

Grossesse et allaitement

- Contre-indiqué pendant la grossesse.
- Utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 12 semaines après la dernière injection.
- L'allaitement est déconseillé.

À retenir

- ✓ Le Brodalumab est un traitement efficace dans certaines formes sévères de psoriasis.
- ✓ Il agit sur le système immunitaire : vigilance particulière vis-à-vis des infections.
- ✓ Un suivi médical régulier est indispensable.
- ✓ Pas de vaccins vivants pendant le traitement.
- ✓ Signalez rapidement toute infection, diarrhée persistante ou douleur abdominale.