



Omalizumab – informations pour les patients

(Xolair®)

Présentation

- Omalizumab (Xolair®) est un anticorps monoclonal (IgG1 anti-IgE).
- Présenté en stylo ou seringue préremplie de 75 mg, 150 mg ou 300 mg.
- Conservation : au réfrigérateur (2–8 °C).

Prix indicatif : environ 411 € la seringue de 300 mg (remboursé à 65 % par la Sécurité sociale).
Médicament de Liste I – délivré uniquement sur ordonnance de médicament d'exception.

Prescription

- Prescription et renouvellement réservés aux spécialistes : pneumologie, pédiatrie, ORL, dermatologie, médecine interne, ou allergologie.
- Injection généralement réalisée en milieu médical au départ.
- En l'absence d'antécédent d'anaphylaxie, le patient peut s'auto-injecter à partir de la 4^e dose, si le médecin l'autorise.

Indications

- Urticaire chronique spontanée résistante aux antihistaminiques H1 (chez l'adulte et l'adolescent ≥ 12 ans).
- Asthme allergique sévère (dès 6 ans).
- Polypose naso-sinusienne.

Posologie habituelle

- Urticaire chronique : 300 mg en injection sous-cutanée toutes les 4 semaines.
- La dose est répartie sur au moins 2 sites d'injection (ex. 2 seringues de 150 mg).
- Avant de voyager ou selon la zone de résidence : penser à vérifier et traiter une éventuelle parasitose.

Contre-indications

- Hypersensibilité connue à l'omalizumab ou à l'un des excipients.

Interactions

- Aucune interaction médicamenteuse connue.

Effets indésirables possibles

- Réactions au point d'injection (rougeur, douleur, gonflement).
- Réactions allergiques locales ou générales (même après une longue période de traitement).
- Infections parasitaires (helminthiases) plus fréquentes sous traitement.
- Infections respiratoires hautes (rhume, sinusite).
- Céphalées, douleurs articulaires.
- Hypersensibilité au latex (capuchon de l'aiguille).

Un suivi médical est recommandé, en particulier lors des premières injections.

Efficacité

- Délai d'action variable : 1 à 6 mois.
- Une évaluation est faite après 12–16 semaines (par le score UAS7 en cas d'urticaire).
- Taux de réponse : 70 à 90 % des patients.



Surveillance

- Clinique uniquement (consultation si événement intercurrent).
- Pas de prise de sang régulière nécessaire.

Grossesse et allaitement

- Peut être utilisé pendant la grossesse si nécessaire, en particulier en cas d'asthme sévère.
- Allaitement : usage possible.

Points clés :

- Omalizumab est un traitement ciblé et efficace pour l'urticaire chronique sévère et l'asthme allergique.
- Le traitement est long : l'efficacité se juge après plusieurs mois.
- L'auto-injection est possible après validation médicale, sous conditions de sécurité.
- Bien respecter la chaîne du froid (réfrigérateur).
- Signaler tout antécédent d'allergie sévère ou toute réaction inhabituelle après injection.