



Propranolol - HEMANGIOL® – Informations pour les parents

À quoi sert ce traitement ?

Hemangiol est utilisé pour traiter les hémangiomes infantiles qui nécessitent un traitement par voie orale.

Il agit sur les vaisseaux sanguins pour réduire la taille et la coloration de l'hémangiome.

Comment l'utiliser ?

Donner 2 fois par jour, une dose le matin et une en fin d'après-midi, avec au moins 9 h d'intervalle.

Toujours pendant ou juste après un repas, jamais avant le coucher.

Utiliser uniquement la seringue fournie pour mesurer la dose exacte.

Si l'enfant refuse : mélanger la dose avec une très petite quantité de lait ou de jus adapté à son âge

- 5 ml : équivalent d'une cuillère à café si < 5 kg
- 15 ml : équivalent d'une cuillère à soupe si > 5 kg)
- utiliser dans les 2 h.

Quand ne pas l'utiliser ?

Ne pas donner Hemangiol si votre enfant :

- ne mange pas assez,
- vomit,
- est malade (fièvre, diarrhée, infection),
- a des difficultés respiratoires ou une respiration sifflante

Ne jamais donner une double dose en cas d'oubli.

Effets secondaires importants à surveiller

Hypoglycémie (baisse du sucre)

C'est le principal risque.

Signes d'alerte :

- pâleur, sueurs, fatigue, tremblements, faim, difficultés à se réveiller
- somnolence inhabituelle, calme inhabituel avec peu d'intérêt pour l'environnement, baisse de l'appétit



Dermagic

Toute la dermatologie en un clic

<https://dermagic.fr>

Signes graves :

- convulsions,
- pauses respiratoires
- perte de connaissance.

Que faire ?

- Arrêter Hemangioli immédiatement.
- Si votre enfant est conscient : donner une boisson sucrée.
- Si les symptômes persistent ou que votre enfant est inconscient ou ne peut pas avaler : aller immédiatement à l'hôpital ou contacter le 15.

Difficultés respiratoires (ou bronchospasme)

Hemangioli® peut entraîner un rétrécissement des voies respiratoires, à l'origine de difficultés respiratoires (comme pour l'asthme).

Ces effets sont notamment liés aux infections bronchiques hivernales.

Signes d'alerte :

- Toux
- Respiration rapide ou difficile
- Respiration sifflante (avec ou sans coloration bleutée de la peau)

Que faire ?

- Arrêter Hemangioli et consulter un médecin sans attendre
- Le traitement ne pourra être repris que lorsque l'enfant sera complètement rétabli.