



Avelumab – informations pour les patients

Bavencio®

Présentation

- Bavencio® (avelumab)
- Immunothérapie anti-PD-L1, anticorps monoclonal humain
- Solution 20 mg/mL à diluer pour perfusion
- Perfusion IV en hôpital de jour

Prix

- Environ 651 € / flacon
- ~2 600 € par perfusion (dose 800 mg)

Indication en dermatologie

- Carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique de l'adulte — en monothérapie

Posologie

- 800 mg IV en perfusion de 60 minutes
- Toutes les 2 semaines
- Poursuivre jusqu'à progression ou toxicité intolérable
- Pré-médication : antihistaminique + paracétamol recommandés

Contre-indication

- Hypersensibilité à l'un des composants

Précautions

- Grossesse, allaitement
- Diabète insulino-dépendant
- Hépatite B/C, VIH
- Maladie auto-immune active
- Métastases SNC
- Antécédent de transplantation d'organe
- Traitement immunosuppresseur associé

Interactions

- Précaution si association avec axitinib
- Éviter vaccins vivants pendant le traitement

Effets secondaires (principaux)

- Fréquents : anémie, perte d'appétit, hyponatrémie, céphalées, vertiges, neuropathie périphérique, hypertension
- Digestifs : nausées, diarrhée, constipation, douleurs abdominales, vomissements
- Respiratoires : toux, dyspnée
- Cutanés : prurit, éruption, xérose
- Musculo-squelettiques : arthromyalgies, myalgies
- Généraux : fatigue, fièvre, frissons, syndrome pseudo-grippal, œdèmes
- Réactions liées à la perfusion → prémédication recommandée



- Immunomédiés : dysthyroïdie, pneumopathie, hépatite, colite, insuffisance surrénalienne, pancréatite, myocardite, néphrite, diabète de type 1 etc.

Surveillance

- Clinique et biologique rapprochée
- Bilans et examen lors de chaque perfusion (toutes les 2 semaines)
- Surveillance particulière des signes infectieux et des signes respiratoires, digestifs, thyroïdiens, cardiaques, rénaux, hépatiques

Grossesse / Allaitement

- Contraception efficace pendant le traitement et ≥ 1 mois après la dernière dose
- Allaitement : interrompre pendant le traitement et au moins 1 mois après l'arrêt (peu de données)

Gestion des effets indésirables

- Signaler tout symptôme nouveau ou inhabituel rapidement
- Corticothérapie et prise en charge spécialisée pour effets immunomédiés graves
- Ralentir/stopper perfusion selon gravité des réactions

Voir aussi : brochure information patient labo Merk : https://www.merckgroup.com/fr-fr/plan-de-gestion-des-risques/PGR-Bavencio_Brochure_Patient_V4_2020_10.pdf