



Bimekizumab — Information pour les patient(e)s
(Bimzelx®)

Présentation

- **Nom du médicament** : Bimekizumab (Bimzelx®)
- **Forme** : injection sous la peau (seringue ou stylo pré-rempli)
- **Classe** : traitement ciblé (biothérapie), anticorps monoclonal qui bloque certaines substances responsables de l'inflammation (IL-17A, IL-17F).
- **Prix** : environ 1 678 € (boîte de 2 stylos)
- **Remboursement** : pris en charge à 65 % par la Sécurité sociale dans certaines maladies sévères.

Pourquoi est-il prescrit ?

Le Bimzelx® est utilisé chez l'adulte dans :

- **Psoriasis en plaques chronique modéré à sévère** (après échec d'autres traitements comme photothérapie ou médicaments par comprimés).
- **Hidradénite suppurée** (maladie de Verneuil) modérée à sévère, quand les traitements habituels ne sont pas efficaces.
- **Rhumatisme psoriasique et spondylarthrite axiale** (autres indications, non dermatologiques).

Comment le prendre ?

- Le traitement se fait par injections sous la peau, en général au niveau du ventre ou de la cuisse.
- Psoriasis : 1 injection de 320 mg toutes les 4 semaines jusqu'à la 16e semaine, puis toutes les 8 semaines.
- Hidradénite suppurée : toutes les 2 semaines au début (jusqu'à 16 semaines), puis toutes les 4 semaines.
- La première injection doit être réalisée dans un service médical, à cause du risque rare d'allergie.

Points importants avant de commencer :

Avant de débuter le traitement, votre médecin vérifie :

- L'absence de contre-indication au traitement.
- Vos antécédents infectieux (tuberculose, infections chroniques).
- Vos vaccins : pas de vaccin vivant pendant le traitement (ROR, varicelle, fièvre jaune...).

Contre-indications

Le traitement ne doit pas être utilisé en cas de :

- Infection grave en cours.
- Tuberculose active.
- Allergie connue au produit.
- Grossesse ou allaitement (contraception recommandée pendant le traitement et jusqu'à 17 semaines après l'arrêt).

Surveillance pendant le traitement

- Pas de prise de sang systématique, mais une surveillance clinique régulière.
- Prévenir votre médecin en cas de **fièvre, toux persistante, douleurs abdominales, diarrhées inhabituelles ou infections répétées**.



Effets indésirables possibles

- Infections : respiratoires, mycoses (candidose buccale), infections cutanées.
- Réactions au point d'injection (rougeur, douleur).
- Troubles digestifs : risque d'aggravation d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MICI).
- Autres : céphalées, fatigue, éruptions cutanées (eczéma, folliculite, acné).

Efficacité

- **Psoriasis** : efficacité évaluée après 16 semaines. Le traitement est arrêté s'il n'est pas efficace.
- **Hidradénite suppurée** : amélioration souvent visible dès la 2e semaine, avec maintien possible à long terme.

À retenir

- ✓ Le Bimekizumab est un traitement efficace pour certaines maladies chroniques de la peau (psoriasis, hidradénite suppurée).
- ✓ Il agit en bloquant une partie de l'inflammation, mais augmente légèrement le risque d'infections.
- ✓ Un suivi régulier avec votre médecin est indispensable.
- ✓ Pas de vaccins vivants pendant le traitement.
- ✓ Signalez immédiatement toute infection ou problème digestif inhabituel.