



Anifrolumab – informations pour les patients

Saphnelo®

Présentation

- Saphnelo® 300 mg
- Solution à diluer pour perfusion IV

Prix

- Environ 926 € / flacon

Prescription

- Médicament de liste I
- Administration hospitalière (hôpital de jour)

Classe

- Anticorps monoclonal humain IgG1 kappa

Indications

- Lupus érythémateux systémique (LES) modéré à sévère, actif
- Présence d'auto-anticorps (AAN, Anti-DNA, Anti-Sm)
- Après échec d'un traitement standard bien conduit
- Utilisé en 2^e ligne en association aux traitements standards

Posologie

- 300 mg IV en 30 min
- Perfusion toutes les 4 semaines

Contre-indications

- Hypersensibilité connue

Interactions

- Pas de métabolisme hépatique ou élimination rénale attendue
- Éviter vaccins vivants ou atténués pendant le traitement

Effets secondaires

- Infections : voies respiratoires supérieures, bronchites, zona
- Réactions à la perfusion : 9 %, généralement légères à modérées
- Hypersensibilité : environ 2,8 %
- Immunogénicité : très rare (1,7 %)

Efficacité

- Diminution globale de l'activité de la maladie à 52 semaines
- Réduction de la corticothérapie systémique à 52 semaines
- Amélioration des lésions cutanées (CLASI) dès 12 semaines

Surveillance

- Signes infectieux pendant tout le traitement
- Surveillance renforcée en cas de bronchites répétées ou zona



Grossesse / Allaitement

- Non recommandé pendant grossesse
- Contraception nécessaire pendant traitement
- Allaitement : interrompre soit traitement, soit allaitement selon contexte clinique

Conclusion

- Option de traitement efficace pour LES modéré à sévère
- Suivi rapproché pour infections et tolérance perfusions.