Abrocitinib – informations pour les patients

(Cibinqo®)

Présentation

- Nom commercial : Cibinqo®
- Formes disponibles : comprimés à 50 mg, 100 mg, 200 mg
- Prix indicatif : environ 1 195 € la boîte de 28 comprimés, quel que soit le dosage.
- Médicament de Liste I – soumis à ordonnance d'exception.
- Prescription initiale hospitalière annuelle, réservée aux spécialistes en dermatologie, allergologie et médecine interne.

Classe thérapeutique

- Immunosuppresseur
- Inhibiteur sélectif de la Janus Kinase 1 (JAK1)

Indication en dermatologie

- Dermatite atopique (eczéma) modérée à sévère de l'adulte et de l'adolescent (≥ 12 ans) nécessitant un traitement systémique
- En cas d'échec, d'intolérance ou de contre-indication aux autres traitements (comme la ciclosporine).

Posologie habituelle

- Début du traitement : 200 mg 1 fois par jour (pendant 12 semaines).
- Entretien : la dose est adaptée en fonction de la tolérance et de l'efficacité, entre 50 et 200 mg/jour.
- Adaptation de la dose : chez les patients âgés (> 65 ans) ou insuffisants rénaux : 50 à 100 mg/jour.
- Les comprimés doivent être pris entiers, avec ou sans repas.

Contre-indications

Abrocitinib ne doit pas être utilisé en cas de :

- Grossesse (contre-indiqué) ou allaitement (éviter).
- Cytopénies sévères (globules rouges, blancs ou plaquettes très bas).
- Infections graves actives (tuberculose, infection sévère en cours).
- Insuffisance hépatique sévère.
- Allergie connue au médicament ou à l'un de ses composants.

Interactions médicamenteuses

Abrocitinib peut interagir avec :

- Certains antifongiques (fluconazole), antidépresseurs (fluvoxamine).
- Antiépileptiques, millepertuis.
- Résines chélatrices, topiques gastro-intestinaux et antiacides.

Signaler tous vos traitements au médecin ou au pharmacien avant d'initier le traitement.

Effets indésirables possibles

Les principaux effets connus sont :

- Troubles sanguins : baisse des globules rouges, blancs ou plaquettes (surveillance).
- Augmentation du cholestérol (surveillance).
- Infections (respiratoires, virales, réactivation d'infections latentes comme l'herpès ou l'hépatite).
- Risque thrombo-embolique (caillot, phlébite, embolie pulmonaire).

- Risque accru de cancer cutané : dépistage régulier recommandé.

Surveillance médicale

Avant de commencer

- Consultation spécialisée avec examen clinique complet.
- Bilan sanguin.
- Radiographie pulmonaire.
- Vérification et mise à jour des vaccins (pas de vaccin vivant pendant le traitement).

Pendant le traitement

- Bilan sanguin à 12 semaines, puis régulièrement (globules, foie, reins, cholestérol, triglycérides).
- Surveillance de la tension artérielle.
- Dépistage cutané (suivi dermatologique) pour détecter précocement les cancers de la peau.

Grossesse et allaitement

- Contre-indiqué pendant la grossesse.
- Éviter pendant l'allaitement.
- Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace.
- Si grossesse prévue : arrêt du traitement avant la conception.

Précautions particulières

- Évaluer le risque cardiovasculaire avant de commencer (antécédents familiaux, tabac, cholestérol, tension, diabète…).
- Prudence en cas d'antécédents de phlébite, embolie pulmonaire ou thrombophilie → parfois contre-indication.
- Adapter les mesures de prévention lors de situations à risque (chirurgie, immobilisation, longs voyages).

Efficacité

- L'efficacité est évaluée au bout de 24 semaines de traitement.
- Si aucune amélioration : arrêt du traitement.
- Dans les études cliniques, abrocitinib a montré une supériorité au placebo et au dupilumab (à la dose de 200 mg).

Points clés

- Abrocitinib est un traitement oral innovant pour l'eczéma sévère.
- Le traitement est efficace mais nécessite une surveillance médicale régulière (sang, tension, peau).
- Il existe un risque accru d'infections, de troubles sanguins et cardiovasculaires.
- Pas de vaccins vivants pendant le traitement.
- Respecter les consultations de suivi et signaler tout signe d'infection, de fièvre, de douleur thoracique ou de jambe gonflée.