



### Risankizumab — information pour les patient(e)

#### Qu'est-ce que le risankizumab ?

Le risankizumab (Skyrizi®) est un médicament utilisé pour traiter certaines maladies inflammatoires de la peau ou des articulations.

Il cible spécifiquement l'interleukine 23, protéine impliquée dans les réponses inflammatoires du psoriasis.

Il existe sous forme de stylo ou de seringue préremplie (150 mg, 90 mg/mL) ou en solution pour perfusion.

#### Prix

Environ 2 747 € par seringue, pris en charge par la sécurité sociale à 65% et sa part restante par les mutuelles complémentaires santé. La demande de prise en charge en Affection Longue Durée (ALD) 100% n'est pas systématique.

#### Pour quelles maladies ?

- **Psoriasis en plaques modéré à sévère** chez l'adulte, quand un traitement systémique classique n'a pas été suffisant, mal toléré ou contre-indiqué.
- **Rhumatisme psoriasique.**

#### Comment se déroule le traitement ?

Avant le traitement : recherche d'antécédents d'infection chronique ou cancer, examen clinique complet. Une prise de sang est à réaliser avant le début du traitement.

Le calendrier vaccinal doit être mis à jour, le traitement pouvant toutefois être débuté après les premières doses de vaccin dans le cas où plusieurs doses sont nécessaires.

Administration (psoriasis) :

- 150 mg en injection sous la peau (cuisse, abdomen ou bras).
- Injections à :
  - **Semaine 0**,
  - **Semaine 4**,
  - **puis toutes les 12 semaines** en entretien.

Le traitement est disponible en pharmacie de ville à partir d'une ordonnance spécifique de Médicament d'Exception.

Le traitement est à conserver au réfrigérateur (ne doit pas être congelé).

#### Contre-indications

- Allergie au médicament.
- Infection en cours.

#### Interactions avec d'autres médicaments

Aucune interaction connue.

Pas de vaccin vivant durant le traitement.

#### Effets secondaires possibles

La plupart des effets indésirables sont légers à modérés.



Les infections graves sont très rares mais en cas de fièvre persistante, douleur intense persistante ou tout autre symptôme inhabituel : le traitement doit être interrompu.

- Infections respiratoires (rhume, toux...).
- Éruption cutanée, démangeaisons, urticaire.
- Réactions allergiques.
- Mycoses superficielles (dermatophytoses).
- Infection par le virus de l'herpès (HSV).
- Rougeur/douleur au point d'injection.
- Maux de tête.

### Efficacité

Le traitement peut être arrêté s'il n'est pas efficace après **16 semaines**.

### Suivi pendant le traitement

- Bilan complet avant de débuter.
- Ensuite, un suivi peut être proposé tous les 3 mois (facultatif).

### Grossesse et allaitement

- Utiliser une **contraception efficace pendant le traitement** et jusqu'à **21 semaines après l'arrêt**. Les données concernant l'utilisation du traitement chez la femme enceinte ou durant l'allaitement sont limitées.
- Allaitement **déconseillé** pendant le traitement.

### Précautions à prendre sous risankizumab

Certaines situations de la vie quotidienne nécessitent une adaptation du traitement : certains vaccins, séjour à l'étranger, soins dentaires, intervention chirurgicale, désir de grossesse.

Dans chacune de ces situations, la conduite à tenir devra être discutée au cas par cas avec votre dermatologue. Il est également important d'informer votre médecin que vous êtes traité par risankizumab avant de prendre un autre médicament.

Un suivi régulier par votre médecin traitant et/ou votre dermatologue est nécessaire pendant le traitement.

En cas de questions concernant ce traitement ou en cas d'urgence, vous pouvez toujours joindre votre dermatologue ou médecin traitant.